

Sistema de vigilancia integral de la gripe

Temporada 2014-15

Sección de Vigilancia
Epidemiológica

Semana 09/2015

(23 de febrero a 1 de marzo de 2015)

Datos Globales


semanas 06-09

Semana	Tasa centinela (casos por 100.000 hab.)	Tasa EDO (casos por 100.000 hab.)	Aislamientos virus gripal	Casos graves de gripe	Defunciones por gripe
6	203.70	182.47	2	6	1
7	201.05	145.47	1	4	1
8	130.95	112.01	2	2	0
9	116.40	83.97	1	1	0


Tasas centinela comparadas.

Temporadas 2013-14 // 14-15

CANTABRIA




Declaración diaria de gripe. Seguimiento en "tiempo real". (Sistema EDO-OMI)




Serie temporal de tasas centinela

Cantabria 2003-2015




Tasas nacionales y autonómicas comparadas

Campaña de vigilancia de gripe 2014-15



Aislamientos virales (subtipos)


Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe. Cantabria 2014-15




Difusión espacial de la gripe

Nivel nacional


Cantabria. Semana 07/2015



Cantabria. Semana 09/2015






Cantabria. Semana 08/2015




Difusión espacial de la gripe

Red Centinela. Análisis espacial.




Distribución por sexo de casos de Gripe.

Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe. Cantabria 2014-15




Tasas por edad por 100.000 hab.

Casos acumulados durante toda la temporada 2014-15




Situación vacunal de casos.

Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe. Cantabria 2014-15




Declaración de bajas laborales y absentismo escolar

Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe. Cantabria 2014-15



Casos graves hospitalizados y defunciones durante la onda epidémica

Campaña de gripe 2014-15 CANTABRIA



Informe de situación de la gripe. (Cantabria)

- Desciende de la incidencia de casos en Cantabria aunque aún se coloca por encima del umbral epidémico.
- Los últimos aislamientos virales siguen mostrando el predominio del virus AH3N2 con aparición esporádica del virus B.
- La declaración de casos se sigue concentrando en focos específicos donde aún se detectan niveles de casos más o menos importantes. Estos focos se concentran en la zona oriental de Cantabria, mientras en zonas extensas de la Comunidad la onda epidémica está prácticamente extinguida.
- La situación es similar a lo que sucede a nivel nacional tanto en incidencia como en aislamientos de muestras virales, aunque la incidencia de Cantabria se mantiene inferior a la del conjunto nacional
- **Casos Graves de Gripe.** En paralelo a lo anterior sigue disminuyendo la frecuencia de declaración de casos graves. Hasta la fecha se han declarado un total de 27 enfermos, con 4 fallecimientos

Informe de situación de la gripe. (Nacional)

(Fuente CNE)

Desciende la onda epidémica gripal en España con un actividad asociada a circulación mixta de virus de la gripe A(H3N2) y B

- En la semana 09/2015 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 145,61 casos por 100.000 habitantes, tras alcanzar el pico de la onda epidémica de esta temporada en la semana 05/2015.
 - De las 310 muestras centinela, 146 fueron positivas para el virus de la gripe (47%): 51,4% B y 47,9% A y 0,2% C, siendo 89% A(H3N2) y 11% A(H1N1)pdm09, entre los subtipados (62%). Desde el inicio de la temporada se ha identificado un 65,7% virus A, 34,2% virus B y 0,1% virus C, siendo el 97% de los virus A subtipados A(H3N2).
 - Un 62% de los virus A(H3N2) caracterizados hasta el momento pertenecen a grupos genéticos que presentarían diferencias con el virus vacunal de esta temporada.
 - Desde la semana 40/2014 se han notificado 18 brotes de gripe en ocho Comunidades Autónomas, diez en residencias geriátricas, la mayoría por virus A(H3N2), y ocho en instituciones sanitarias, seis por virus A [5 A no subtipado y 1 A(H3N2)] y dos por virus B.
 - Desde el inicio de la temporada se han notificado 1.268 casos graves hospitalizados confirmados de gripe [81% A (85% A(H3N2) y 15% A(H1N1)pdm09, entre los subtipados) y 19% B]. El 60% en mayores de 64 años. De las 145 defunciones por infección confirmada de gripe, el 77% se han producido en mayores de 64 años.
 - Se observa un exceso de la mortalidad por todas las causas, por encima de lo esperado desde que se inició el año 2015, que se concentra fundamentalmente en personas mayores de 64 años.
 - En Europa persiste elevada actividad gripal, sobre todo en los países del oeste y centro de la región. En el Norte de América disminuye la actividad gripal, asociada a circulación mayoritaria de virus A(H3N2). En las últimas semanas aumenta la circulación de virus B en Canadá.

Previsión

**Onda epidémica descendente.
Focalización de casos**

INCIDENCIA MEDIA-BAJA

Acercamiento progresivo a niveles interepidémicos. Mantenimiento de circulación focal residual. Extinción de la onda en los próximos días

RED CENTINELA DE CANTABRIA DE VIGILANCIA DE GRIPE

